La transfusion : de l'idéal à la réalité, l'audit de terrain comme outil de choix pour améliorer les connaissances et la réalisation.

Nathalie Jacques – Coordinatrice qualité

Congrès CIPIQ-S

22 & 23 Octobre 2015 - Liège

WWW.CMSENAMUR.BE

FOYER
SAINT-FRANÇOIS
Centre de Soins Palliatifs à Namur

CLINIQUE ET MATERNITE
SAINTE-ELISABETH • NAMUR

Plan de l'exposé

1. Introduction
2. Démarche
3. L'audit
4. L'audit de transfusion
5. Conclusions

INTRODUCTION

La Clinique et Maternité Ste-Elisabeth

Description de la CMSE

- Hôpital aigu
 - 311 lits – 9 salles d'opération
 - Chirurgie, Médecine, Médecine aiguë (urgences, USI), Gériatrie, Mère-enfant (pédiatrie, maternité, bloc accouchement et CNN),
 - Hôpitaux de jour : Oncologie-Hématologie, Hôpital de jour chirurgical
 - Plateaux spécifiques : imagerie médicale, radiothérapie, biologie clinique, dialyse, polycliniques

Quelques chiffres

- 202 médecins
- 1100 collaborateurs
- 47000 m²
- 20 743 admissions en hospitalisation
- 25 525 admissions aux urgences
- 200 620 consultations
- 1646 accouchements

Chiffres 2014

CLINIQUE ET MATERNITE
SAINTE-ELISABETH • NAMUR

Une clinique résolument tournée vers l'avenir

CLINIQUE ET MATERNITE
SAINTE-ELISABETH • NAMUR

DEMARCHE

Les Influences

Plateforme HémoVigilance

Contrat QS

Démarche

Management Qualité

Incidents

Analyse des incidents

Gestion des incidents

Incidents

- Transport des poches (en période de garde)
- Traçabilité des bons de commandes
- Accès à la banque de sang
- Identification des prélèvements et/ou de la demande
- Transfert de patient en cours de transfusion

Incidents

Pas d'analyse systémique

constat d'une problématique liée au sang

EVIDENCE : Faisons un audit de la procédure de transfusion

sur des sujets particuliers (bracelet)

pratique courante dans un département
certifié ISO 9001

Audits

groupe d'auditeurs

PARENTHÈSE : L'AUDIT

L'audit – définition

Processus **systematique**, indépendant et **documenté** permettant d'obtenir des **preuves** et de les évaluer de manière **objective** pour déterminer dans quelle mesure les critères d'audit sont satisfaits.

Réf : ISO / CD1 19011 : 2001

L'audit - Buts

Bénéfices de l'audit :

- Outil d'amélioration continue :
 - Etat des lieux
 - Points faibles et/ou NC
 - Actions pour corriger les écarts
- Facteur d'amélioration de la confiance du client
- Outil de communication – motivation

L'audit – Principes

Principes :

- Outil de management
- Objectivité, indépendance et transparence dans la planification
- Approche systématique et cohérence
- Déontologie
- Confidentialité

L'audit - Principes

Autrement dit :

- Auditeurs formés
- Procédure d'audit
- Résultats enregistrés et suivis
- Système efficace d'information et de suivi

L'auditeur : ce qu'il est

Connaissances : référentiel, secteur audité,
technique de l'audit

Attitude

- Sympathique et aimable
- Confiant
- Ouvert
- Enthousiaste
- Positif
- Rigoureux, tenace et flexible
- **Objectif**
- Indépendant

L'auditeur : ce qu'il n'est pas

Attitude :

- D'espionnage, d'enquête
- Négative
- Agressive
- De règlement de compte
- De confrontation
- Porter des **jugements** de valeurs
- Dépendant

L'AUDIT DE TRANSFUSION

Etapes

- Avis du comité de direction
- Choix des auditeurs
- Préparation
- Choix d'une date
- Réalisation
- Rapport
- Communication des résultats

Etapes

- Choix des auditeurs
 - Coordinatrice qualité
 - Expert : Infirmière chef (non formée à l'audit)
- Préparation :
 - But de notre audit : image la plus fidèle possible de la situation réelle

Etapes

- Préparation (suite):
 - Méthodologie : Observation en banque de sang de la réception d'une commande de produits sanguins. Suivi de poches de produits sanguins depuis leur retrait en banque de sang jusqu'au service destinataire et observation des étapes réalisées par les soignants de la prise en charge des produits jusqu'à la fin de la transfusion. Discussion ouverte avec les personnes rencontrées.

Réalisation pratique - Préparation

- Formation du 2^{ème} auditeur
- Prise de contact avec la BSG (renseignements pratiques)
- Détermination de la date : non communiquée au terrain
- Lecture de la documentation (procédure, formulaires, ...)

Réalisation pratique – Jour J

- 9h : déplacement en BSG
 - Observation et discussion avec le personnel sur leurs pratiques et leurs difficultés
 - Arrivée d'une commande de sang du bloc
 - Observation en direct de la gestion des NC
 - Retrait de poches pour les urgences
 - Suivi de la poche, chronométrage des étapes et discussion ouverte avec le personnel
 - Information par la BSG des autres retraits pour la chimio et un étage d'hospitalisation

Rapport

2. Constatations générales

Banque de sang :

- NC possibles :
 - Identification des tubes à la main : justification « Procédure de transfusion sanguine, p:11 »
« Il est obligatoire d'inscrire à la main les renseignements utiles sur le tube de sang qui vient d'être prélevé au patient. L'écriture manuelle prend plus de temps, mais elle permet une vérification, et donc une sécurité supplémentaire. »
 - Identification du préleveur : si non noté sur le bon, contact avec l'unité du patient, quid si le préleveur n'est plus présent ?
 - NC récurrentes : modalité de communication aux responsables de service ? Proposition : fournir un listing des chefs de services avec tél et mail.
 - Actuellement : appels informels aux services si impression de récurrence de NC (par exemple pas d'identification du préleveur)

3. Propositions :

- Rédiger des procédures opérationnelles à destination des différents soignants
- Formation/information sur la procédure pour expliquer le pourquoi des étapes à respecter.
- Ajouter une zone sur le bon de commande pour l'origine du prélèvement et la destination des produits (ex : bloc op, bloc accouchement, ...) ou téléphone de contact.
 - Synthèse de la procédure sur les documents : au verso de la commande et sur le rapport de transfusion.

Constats

- Niveaux :
 - BSG
 - Unités de soins
 - Procédure
- Types :
 - Écarts réels à la procédure :
 - Identification manuelle des prélèvements
 - respect du temps,
 - double vérification
 - Où trouver la procédure
 - Application pratique difficile de la procédure
 - Vérification au lit du patient en chimio = impossible
 - Éléments manquants pour faciliter le travail
 - Sur bon de commande : pas la présence d'un n° de contact ou du service où se trouve le patient au moment du prélèvement

Théorie

PROCEDURES DE TRANSFUSION SANGUINE

A L'USAGE DU PRATICIEN DE L'ART INFIRMIER ET DES MEDECINS CLINIENS

26 pages

TABLES DES MATIERES

1. INTRODUCTION
2. COMMANDE DE PRODUITS SANGUINS LABILES (PSL)
3. PRELEVEMENT DE L'ECHANTILLON SANGUIN
4. PROCEDURES PREALABLES A LA TRANSFUSION
5. CONSERVATION ET TRANSPORT DES PRODUITS SANGUINS LABILES
6. ADMINISTRATION DES PRODUITS SANGUINS LABILES
- 7 REACTION TRANSFUSIONNELLE
8. ANNEXE

Pas de confrontation avec la réalité du terrain
Pas de retour du terrain sur les difficultés **aux bons interlocuteurs**

PROCEDURE

Vérifications à effectuer avant de placer la transfusion

- 1 S'assurer de l'existence d'un ordre médical
- 2 Effectuer les vérifications éditées sur la fiche de réservation du produit
- 3 Informer le patient
- 4 Signer le rapport de transfusion
- 5 Ne brancher la transfusion qu'une fois toutes les vérifications terminées

Prises des paramètres de départ

- 1 Paramètres : fréquence cardiaque/t°/TA
- 2 Les noter sur le rapport de transfusion
- 3 Noter l'heure du début de la transfusion sur le rapport de transfusion

Pose de la transfusion

S'assurer de la fiabilité de la voie veineuse : pas de rougeur, ni de douleur et bon retour veineux.
Branchement aseptique.

Quand suspecter une réaction transfusionnelle ?

Apparition de symptômes non imputables à la maladie dont souffre le patient
Frissons, fièvre
Urticaire, flush, œdème local ou généralisé
Douleur au site de perfusion
Douleur lombaire, thoracique ou abdominale
Variation de la TA et/ou du pouls
Détresse respiratoire, dyspnée, tachypnée, hypoxémie
Nausées, vomissements, diarrhée
Oligurie, hématurie
Choc

Que faire en cas de réaction transfusionnelle ?

- Arrêter la transfusion
 - Maintenir la perfusion avec du sérum physiologique
- Contrôler les paramètres :
TA/T°/pouls
- Vérifier « la check-list » que le patient a bien reçu le produit qui lui était destiné
- Oxygénothérapie au masque. Ne pas transfuser les autres sacs de la même commande (s'il y en a)
- Prévenir le médecin
 - Appliquer le traitement prescrit
- Remplir le rapport de réaction transfusionnelle Renvoyer la poche incriminée connectée à sa trousse (et les autres poches de la même commande) au laboratoire
- Prélever deux tubes EDTA
Prélever des hémocultures
- Dans le rapport de transfusion ,
cocher OUI à réaction transfusionnelle
- Suivi de la réaction transfusionnelle au J0, J3 et J10 (cfr document annexe).

Communication et suivi

- Comité de direction
- Banque de sang
- Comité Hémovigilance
 - Actions décidées :
 - Revoir le bon de commande
 - Rédiger des procédures adaptées et facilement utilisables par les professionnels
26 pages : document de référence ≠ document de travail

TELEPHONE +32 81 72 04 11
FAX +32 81 72 04 20
EMAIL info@doctormur.be

PATIENT (vignette) N° permanent : Nom : Prénom : Date de naissance : Sexe : Unité de Soins :	MEDECIN PRESCRIPTEUR Nom : Prénom : Date : N° INAMI : Signature : PRELEVEUR Nom : Prénom : Date : Signature : Heure :
---	--

BANQUE DE SANG | Tél. : 081/ 720 512

2 tubes EDTA identifiés à la main (nom, prénom, DDN)

- unité(s) de **Concentré érythrocytaire déleucocyté** pour le :/...../..... àh
- Nouveau-né ou nourrisson** : ml (vol à transfuser) pour le :/...../..... àh
 - Irradié*
 - CMV négatif* (*voir indications au verso)

Indication : **Urgence vitale – Tél immédiatement à la banque de sang – 512**

- Anémie – Dernier taux d'Hb g/100 ml en date du :/...../.....
- Pré-op : Type d'intervention Date et heure :/...../..... àh
- Patient immunodéprimé/hémopathie/néoplasie
- Grossesse en cours

- unités de **Concentré plaquettaire déleucocyté** pour le :/...../..... àh

Indication : Curatif – type de saignement

- Prophylactique
- Pré-op : type d'intervention Taux seuil à atteindre :
- Patient immunodéprimé/hémopathie/néoplasie
- Dernier taux de plaquettes x1000/mm³ en date du :/...../.....

- unité(s) de **Plasma Viro-Inactivé**

Indication : Déficits isolés en facteurs de coagulation V ou XI

- Accident hémorragique dus au surdosage en anti-vitamine K dans la mesure où une correction médicale immédiate est nécessaire rendant le traitement par vitamines K inapproprié
- Hémorragies massives avec déficit combiné de facteurs de coagulation ou thrombolyse
- Purpura thrombotique thrombocytopénique (maladie de Moskowitz)
- Exsanguino-transfusion néonatale pour incompatibilité ABO

Dérivés sanguins stables (cocher et remplir)

- Facteur Von Willebrand _____ unités
- Fibrinogène _____ gr.
- Cofact® _____ unités
- Albumine humaine (100 ml) _____ flacons
- SSPP (400 ml) _____ flacons

Réservé à la Banque de Sang

N° DEMANDE :

Horodater la demande :

Les indications du Concentré érythrocytaire déleucocyté CMV négatif retenues sont :

- Femme enceinte CMV négatif (ou de statut encore inconnu)
- Prématuré de moins de 33 semaines d'âge gestationnel, de mère séronégative pour le CMV
- Patient CMV négatif susceptible d'être allogreffé
- Allogreffes de CSH lorsque le donneur et le receveur sont CMV négatifs
- Receveur de greffe de poumon (quel que soit son statut sérologique)

Les indications d'irradiation retenues sont :

- Greffes de cellules souches hématopoïétiques
- Greffes d'organes sous immunosuppresseurs
- Traitement immunosuppresseurs
- Patients atteints du lymphome de Hodgkin
- Anémie aplasique
- Immunodéficiences congénitales
- Transfusions intrafamiliales

(00215_v1_ban-commande_0016.doc) Auteur responsable : Dr C. Goffinet - - Date : 20/03/2015 - Version : V7

1. OBJET

L'objet de cette procédure est d'expliquer d'une transfusion chez un patient depuis l'élimination des déchets. Elle constitue la transfusion qui lui-même précise en détail.

2. DOMAINE D'APPLICATION

Cette procédure s'applique pour tout patient en contact avec ces patients.

3. DEFINITION

3.1. Produits sanguins labiles (cellules conservées limitées dans le temps, etc.)

4. INDICATIONS

- Le concentré érythrocytaire est indiqué si le patient a une hémoglobine insuffisante en O₂ tissulaire : dans toute situation clinique et biologique quel que soit le patient.
- Le concentré plaquettaire est transfusé thérapeutiquement. La numération plaquettaire transfusée, cette transfusion dépend de la numération plaquettaire.
- Plasma frais congelé virg-inactivé : utilisé dans le traitement de l'hémostasie.

5. PRECAUTIONS

- Voir Manuel de transfusion

6. RISQUES

Les risques transfusionnels peuvent être :
- réactions transfusionnelles immédiates
- effets secondaires à long terme.

Les réactions transfusionnelles immédiates sont variables. Toute réaction transfusionnelle doit être signalée à la banque de sang.

Les effets secondaires à long terme sont problématiques lors de transfusions ultérieures, soit à la transmission de maladies.

Renseignements du patient (adressogramme) au minimum Nom, prénom, DDM et sexe
Prescripteur : Nom, prénom, n° INAMI (cachet), date et signature
Préleveur : Nom, prénom, date et heure du prélèvement, signature (uniquement pour dérivés sanguins labiles)
Produits : cocher et remplir les renseignements relatifs aux produits, urgence et cadre clinique

En cas de NC, la demande ne sera pas exécutée par la BSG et sera retournée à l'unité de soins pour mise en conformité.

Matériel : étiquette patient, frigo box (y compris glaçon)

Pose de la transfusion
S'assurer de la fiabilité de la voie veineuse : pas de rougeur, ni de douleur et bon retour veineux. Branchement aseptique.

Pas de transport du patient pendant la transfusion

transfuser et assume la responsabilité finale
en permanence l'approvisionnement en
l'administration et la surveillance de la
transfusionnelle de l'hôpital.
de Belgique (SFS) : garantit le respect des

Lien vers l'activité infirmière

Suivre sonde vé

Date et heure

Soin | Rappel

Procédure: S
Surveillance

Présence d'un

Vérification d

Sonde permé

Sac collecteu

Vérification du

Observation

Méat urinaire

Écoulement au

Toilette intim

Surveillance

PROCEDURE	NUR-GN-PR-0041
A.s.b.l. Clinique & Maternité Ste Elisabeth Namur	
Surveillance de sonde vésicale à demeure avec ou sans lavage	Date : 25/10/2014 Version : 1

1. OBJET

Définit le suivi de la sonde vésicale avec ou sans lavage vésical ainsi que la surveillance quantitative et qualitative des urines chez tout patient selon les recommandations médicales, d'hygiène et de la littérature (EBN).

Objectifs :

- Définir les éléments de surveillance d'un système de drainage urinaire continu.
- Préciser les précautions à respecter chez le patient porteur d'une sonde vésicale.
- Uniformiser la rédaction des observations qualitatives et quantitatives des urines.
- Suggérer une liste d'informations à donner au patient porteur d'un système de vidange urinaire.

2. DOMAINE D'APPLICATION

S'applique au personnel infirmier des unités de soins de la CMSE.

3. INDICATIONS

Patients porteurs d'une sonde vésicale à demeure.

4. DEFINITION

Sondage vésical : Introduction d'une sonde dans la vessie, par le méat urinaire, pour permettre l'écoulement des urines et/ou évaluer le volume éliminé et/ou instiller dans la vessie un produit thérapeutique

Système urinaire clos : Ensemble formé par la sonde urinaire et le sac collecteur que l'on ne dissocie pas.

Sonde vésicale à demeure : Dispositif placé pour un certain temps.

Nor

Fixe

Nor

CONCLUSIONS

Conclusions

- Outil de choix pour confronter la théorie à l'application du processus
- Sensibiliser les professionnels sur des pratiques risquées et devenues routinières
- Remonter l'information aux bons interlocuteurs
- Suivi jusqu'à la vérification de l'efficacité des mesures correctrices : audit à prévoir après mise en application des mesures correctrices

Conclusions

- Doit faire partie de la mallette du parfait manager

Amélioration Continue

- Audit
- Analyse d'incident
- Analyse de processus
- Tours de sécurité
- Gemba
- Indicateurs
- Informations des clients

Merci de votre

Attention

WWW.CMSENAMUR.BE

CLINIQUE ET MATERNITE
SAINTE-ELISABETH • NAMUR